Relazioni e funzioni



Relazioni binarie

Ogni sottoinsieme del prodotto cartesiano tra due insiemi *A* e B è una **relazione binaria** tra *A* e B.

Se *A* = B si parla di relazione in un insieme

Rappresentazione

Elencazione

Proprietà caratteristica

Diagramma a frecce

Tabella a doppia entrata

Rappresentazione cartesiana

Rappresentazione

$A=\{2\}$ $B=\{1,3\}$ $A \times B=\{(2,1),(2,3)\}$

Elencazione $R=\{(2,3)\} \subset A \times B$

Proprietà caratteristica $R=\{(a,b) \in A \times B \mid a<b\}$

Diagramma a frecce



Rappresentazione

$A=\{2\}$ $B=\{1,3\}$ $A\times B=\{(2,1),(2,3)\}$

Tabella a doppia entrata

A \ B	1	3
2	(2,1)	(2,3)

Rappresentazione cartesiana



Proprietà di una relazione su un insieme

Riflessiva	$\forall a \in A,\ aRa$
Antiriflessiva	$\nexists a \in A,\ aRa$
Simmetrica	$\forall a,b \in A,\ aRb \Rightarrow bRa$
Antisimmetrica	$\forall a,b \in A,\ aRb \Rightarrow b\not{R}a$
Transitiva	$\forall a,b,c \in A,\ aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$

Proprietà di una relazione su un insieme

$A=\{1,2\}$ $A \times A=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$

$R=\{(1,1),(1,2)\}$

~~Riflessiva~~ ~~Antiriflessiva~~

~~Simmetrica~~ Antisimmetrica

Transitiva

Proprietà di una relazione su un insieme

$A=\{1,2\}$ $A\times A=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$

$R=\{(1,1),(1,2),(2,2)\}$

Riflessiva ~~Antiriflessiva~~

~~Simmetrica~~ Antisimmetrica

Transitiva

Proprietà di una relazione su un insieme

$A=\{1,2\}$ $A \times A=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$

$R=\{(1,2)\}$

~~Riflessiva~~ Antiriflessiva

~~Simmetrica~~ Antisimmetrica

~~Transitiva~~

Relazioni di equivalenza

Riflessiva
Simmetrica
Transitiva

Uguaglianza
Congruenza

Equi-estensione
Similitudine

Avere lo stesso resto nella divisione per 5
Avere la stessa altezza di
Essere pari o dispari

Relazioni d'ordine

Antisimmetrica
Transitiva

Essere maggiore di
Essere minore o uguale di
Essere più alto di
Essere più a destra di

Funzioni

Una **funzione** di *A* in B è una particolare relazione che ad ogni elemento del primo insieme *A* associa uno ed un solo elemento del secondo insieme B.



L'insieme *A* si chiama **dominio** della funzione.
L'insieme B si chiama **codominio** della funzione

Funzioni

Una **funzione** di *A* in B è una relazione che ad ogni elemento del primo insieme *A* associa uno ed un solo elemento del secondo insieme B.



Funzioni

Una **funzione** di *A* in B è una relazione che ad ogni elemento del primo insieme *A* associa uno ed un solo elemento del secondo insieme B.



Funzioni

Una **funzione** da A in B esprime un legame.
Ogni elemento di A ***ha*** <u>***un*** solo</u> corrispondente elemento in B.

Funzioni



$f: A \to B$

$x \rightsquigarrow y = f(x)$

y è l'immagine di x

Il sottoinsieme di B costituito da tutte le immagini degli elementi di A è detto immagine del dominio Im (A).

Dominio: A
Codominio: B
Immagine di A: {2,4}

Rappresentazione grafica

Diagramma a frecce



Tabella a doppia entrata

A \ B	3
2	(2,3)

Rappresentazione cartesiana



Grafico di funzione



$f: A \to B$

$x \rightsquigarrow y = f(x)$

Si definisce grafico di una funzione f

$\{(x,y) \mid x \in A \wedge y = f(x) \in B\} \subseteq \mathbf{A \times B}$

Rappresentazione cartesiana



Grafico di funzione

Si definisce grafico di una funzione f
$\{(x,y) \mid x \in A \wedge y=f(x) \in B\} \subseteq \mathbf{A \times B}$

$f: \{1,2,3\} \to \{1,2,3,4,5,6\}$
$x \rightsquigarrow y = 2x$

grafico di f:
$\{(x,2x) \mid x \in A\}$

Rappresentazione cartesiana



Esercizio

A={pianeti del sistema solare}
B={lettere dell'alfabeto Italiano}

$f: A \to B$

A

ad ogni pianeta associa la lettera iniziale del suo nome

B

Determinare dominio e immagine del dominio

Fornire una rappresentazione grafica cartesiana della funzione.

Funzione iniettiva

Una funzione $A \rightarrow B$ si dice iniettiva se
$\forall x_1, x_2 \in A,\ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$



Funzione non iniettiva

Due valori del dominio hanno la stessa immagine



Funzione suriettiva

Una funzione $f: A \to B$ si dice suriettiva se $Im(A)=B$

Una funzione si dice suriettiva se
$\forall y \in B, \exists x \in A \mid f(x)=y.$



Funzione non suriettiva

Almeno un elemento del codominio non è immagine di alcun elemento del dominio



Funzione bigettiva o biunivoca

Una funzione si dice bigettiva se è iniettiva e suriettiva.



Funzione identità

La funzione identità è una funzione su un insieme che ad ogni elemento del dominio fa corrispondere l'elemento stesso.

$$
\begin{aligned}
i:\ & A \to A \\
& x \rightsquigarrow y = f(x) = x
\end{aligned}
$$

$\mathrm{Im}(D) = A$

La funzione identità è biunivoca.

Funzione identità

La funzione identità è una funzione su un insieme che ad ogni elemento del dominio fa corrispondere l'elemento stesso.



Composizione di funzioni

Siano date 2 funzioni f e g così definite

$$f: A \to B \qquad\qquad g: B \to C$$
$$x \rightsquigarrow y = f(x) \qquad\qquad y \rightsquigarrow z = g(y)$$

Si definisce funzione composta di f e g la funzione $h = g \circ f$

$$g \circ f : A \to C$$
$$x \rightsquigarrow y = g(f(x))$$

Composizione di funzioni

$$f: A \to B$$
$$x \rightsquigarrow y = f(x)$$

$$g: B \to C$$
$$y \rightsquigarrow z = g(y)$$



$$g \circ f : A \to C$$
$$x \rightsquigarrow z = g(f(x))$$

Funzioni composte

$f: \{1,2\} \rightarrow \{2,4\}$

$x \rightsquigarrow y = 2x$

$g: \{2,4\} \rightarrow \{1,3\}$

$y \rightsquigarrow z = y-1$



$g \circ f : A \rightarrow C$

$x \rightsquigarrow z = g(f(x))=2x-1$

Funzioni composte

$f: \{1,2\} \rightarrow \{2,4\}$

$x \rightsquigarrow y = 2x$

$g: \{2,4\} \rightarrow \{1,3\}$

$y \rightsquigarrow z = y-1$



$f \circ g : N \rightarrow N$

$x \rightsquigarrow z = f(g(x))=2(x-1)$

La composizione non è commutativa

Funzione inversa

Sia data una funzione biunivoca

$$f: A \to B$$
$$x \rightsquigarrow y = f(x)$$

Si definisce funzione inversa di f la funzione f^{-1}

$$f^{-1}: B \to A$$
$$y \rightsquigarrow x \mid f(x) = y$$

Anche la funzione inversa è biunivoca e invertibile.

Funzione inversa

N.B: Non confondere f^{-1} con $1/f$

Ogni funzione $f: A \rightarrow B$ iniettiva è invertibile se si riduce il codominio a $Im(A)$.

Funzione inversa

$f: A \to B$

$x \rightsquigarrow y = f(x)$

$f^{-1}: B \to A$

$y \rightsquigarrow x \mid f(x) = y$



$i = f^{-1} \circ f : A \to A$

$x \rightsquigarrow f^{-1}(f(x)) = x$

Funzione inversa

$f: A \to B$

$x \rightsquigarrow y = f(x)$

$f^{-1}: B \to A$

$y \rightsquigarrow x \mid f(x) = y$



$i = f \circ f^{-1} : B \to B$

$y \rightsquigarrow f(f^{-1}(y)) = y$

Esercizio

A={pianeti del sistema solare}
B={lettere dell'alfabeto Italiano}

f:A→B

A

ad ogni pianeta
associa la lettera
iniziale del suo nome

B

Stabilire se f è iniettiva, suriettiva o bigettiva.

Dopo aver ristretto B a Im(A), valutare se la funzione è invertibile

Esercizio

A={pianeti del sistema solare}
B={coppie di lettere}

$f: A \rightarrow B$

A → | ad ogni pianeta associa la coppia delle prime due lettere del suo nome | → B

Stabilire se f è iniettiva, suriettiva o bigettiva.

Dopo aver ristretto B a Im(A), determinare f^{-1}

Esercizio

A={pianeti del sistema solare}
B={lettere dell'alfabeto Italiano}
C={numeri naturali minori di 22}

$f: A \to B$

ad ogni pianeta associa la lettera iniziale del suo nome

$g: B \to C$

ad ogni lettera associa un numero che rappresenta la sua posizione nell'alfabeto

Costruire e rappresentare in un modo a scelta la funzione $g \circ f$